

davica tetanus

CEPLJENJE OSNOVNE INFORMACIJE

1. Zakaj je potrebno cepljenje proti davici in tetanusu?

DAVICA in **TETANUS** sta zelo hudi bolezni, ki ju povzročajo bakterije. Davica se prenaša s človeka na človeka, povzročitelj tetanusa pa vstopi v telo skozi vreznine, opraskanine ali rane. Zaradi dolgotrajnega programa cepljenja proti davici in tetanusu se davica v Sloveniji že desetletja ne pojavlja več, tetanus pa redko, v zadnjem desetletju do največ šest primerov letno in še to večinoma pri starejših osebah, ki še niso bile cepljene.

DAVICA

Lahko povzroči debele membranske obloge na zadnji steni žrela. Lahko vodi v težko dihanje, odpoved srca ali celo smrt.

TETANUS

Povzroča boleče mišične krče in togost mišic, lahko po celiem telesu. Togost mišic glave in vratu onemogoča odpiranje ust in požiranje, včasih tudi dihanje. Za tetanusom umre eden od petih bolnikov.

2. Kdo mora biti cepljen, kdaj in s katerim cepivom?

Otroci so proti davici in tetanusu cepljeni v predšolskem in šolskem obdobju. Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma pri treh in petih mesecih starosti ter prvi pozitivni odmerek med 11. in 18. mesecem starosti se opravi s šestivalentnim cepivom (proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, okužbi s hemofilusom influence tipa b, otroški paralizi in hepatitisu B). Drugi pozitivni odmerek (s kombiniranim cepivom proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju) prejmejo v drugem razredu osnovne šole, tretjega pa v srednji šoli oziroma v starosti 16-18 let za vzpostavitev dolgotrajne zaščite.

Osebe, starejše od 5 let, ki še niso bile popolno cepljene, morajo čim prej zaključiti z osnovnim cepljenjem s **kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu**. Odrasli potrebujejo pozitivni odmerek proti tetanusu vsakih 10 let, priporočljivo s **kombiniranim cepivom proti davici in tetanusu**.

Po poškodbi je cepljenje proti tetanusu potrebno za osebe, ki še niso bile cepljene ali če ni dokazov o cepljenju ali je od zadnjega cepljenja minilo več kot 10 let, v skladu s priporočili. V teh primerih je priporočljivo uporabiti **kombinirano cepivo proti davici in tetanusu**.

3. Nekatere osebe ne smejo biti cepljene ali morajo cepljenje začasno odložiti

Če je imela oseba resno alergijsko reakcijo po cepljenju s cepivom proti davici in tetanusu ali je alergična na katerokoli sestavino cepiva, ne sme biti cepljena s takim cepivom.

Previdnost je potrebna, če je oseba imela Guillan Barréjev sindrom v šestih tednih po predhodnem odmerku cepiva, ki vsebuje tetanusni toksoid ali hudo otekanje ali bolečino na mestu cepljenja.

Pri zmerni ali resni akutni bolezni (s povišano telesno temperaturo ali brez) je treba cepljenje začasno odložiti. Blaga bolezen (npr. prehlad) ni ovira za cepljenje.

4. Kakšna so tveganja pri cepljenju proti davici in tetanusu?

Tako kot pri vseh zdravilih tudi pri cepivih obstaja možnost za pojav alergične ali druge reakcije. Kratkotrajna omedlevica se lahko pojavi po vsakem medicinskem posegu, vključno s cepljenjem. Vsaj 15-minutno čakanje po cepljenju sede ali leže lahko prepreči omedlevico ali poškodbe zaradi padcev. Zdravnika je treba opozoriti, če pacient po cepljenju čuti omotico, ima spremembe vida ali zvonjenje v ušesih.

Težave, ki se lahko pojavijo po cepljenju proti davici in tetanusu:

Blage težave (opazne, vendar ne ovirajo aktivnosti):

- bolečina, rdečina ali/in oteklina na mestu cepljenja (pri do 1/3 cepljenih),
- blago zvišana telesna temperatura (pri do 1/15 cepljenih),
- glavobol ali utrujenost (neobičajno).

Zmerne težave (ovirajo aktivnosti, vendar ne zahtevajo obiska pri zdravniku):

- visoka telesna temperatura, $>39^{\circ}\text{C}$ (redko),
- obsežno otekanje na mestu cepljenja (redko).

Resne težave (onemogočajo običajne aktivnosti, zahtevajo obisk pri zdravniku):

- otekanje, resna bolečina, krvavitev in rdečina na mestu cepljenja (redko),
- resna alergijska reakcija se lahko pojavi po vsakem cepljenju. Ocenjujejo, da se pojavi pri manj kot 1/milijon odmerkov.

5. Kaj storiti ob resni reakciji?

Resna alergijska reakcija se običajno pojavi v nekaj minutah do ene ure po cepljenju. Znaki lahko vključujejo težko dihanje, piskanje ali hropenje, oslabelost, hitro bitje srca, omedlevico, bledico ali otekanje žrela. Pacient mora takoj k zdravniku, ki bo ustrezno ukrepal in nato prijavil neželeni učinek po cepljenju.

6. Odškodninska odgovornost za škodo, ki nastane zaradi obveznega cepljenja

Izjemno redko nastopi resen neželen učinek po cepljenju. Oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenskih funkcij, ima pravico do odškodnine, ki se plača iz sredstev državnega proračuna (po Zakonu o nalezljivih boleznih). Več informacij dobite na Ministrstvu za zdravje.

7. Kje lahko dobim več informacij?

Vprašajte izbranega zdravnika, ki vam bo omogočil vpogled v navodilo za uporabo cepiva (PIL) in predlagal še druge vire informacij. Obiščite tudi spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nizz.si /Področja dela/Cepljenje